# Fortecortín 40 mg solución inyectable

**Dexametasona fosfato**

**Composición**

Un inyectable contiene: Dexametasona fosfato, 40 mg (en forma de sal sódica). Excipientes: citrato de sodio, creatinina, edetato de disodio, hidróxido de sodio 1M, agua para preparaciones inyectables.

**Indicaciones**

Fortecortín 40 mg está especialmente indicado en los cuadros de edema cerebral de diversa etiología:

a) por tumores cerebrales primitivos o metastásicos,
b) por traumatismos encefalocraneales,
c) por accidentes vasculares encefálicos (ictus),
d) por neurocirugía.

**Dosificación y modo de empleo**

La pauta de dosificación depende de la gravedad del cuadro clínico y de la naturaleza del mismo. Se sugiere la siguiente pauta:

| Edema cerebral | Dosis inicial | Dosis posterior |
|---|---|---|
| a) Traumatismo cráneo-encefálico | 40-100 mg i.v. | 4-8 mg c/2-4-6 horas |
| b) Infarto o hemorragia cerebral | 40-100 mg i.v. | 4-8 mg c/2 ó 4 horas |
| c) Tumor cerebral | 40-100 mg i.v. | 16 mg c/6 horas |

La duración del tratamiento no debe exceder los ocho días. La vía de administración recomendada para la dosis inicial es la intravenosa, inyectando lentamente (2-3 min.). Según la respuesta obtenida puede continuarse el tratamiento por vía intramuscular. En pacientes en tratamiento por perfusión intravenosa con soluciones de uso habitual, puede inyectarse Fortecortín 40 mg en el tubo del aparato perfusor: no se recomienda mezclarlo en el frasco con la solución que se perfunde.

**Contraindicaciones**

En los casos agudos de urgencia no existen contraindicaciones. En los casos de aplicación sistémica a largo plazo que rebasa la terapéutica de urgencias, las contraindicaciones son las siguientes: Ulceras gastrointestinales. Predisposición a las fracturas óseas espontáneas. Antecedentes de enfermedades mentales. Infecciones virales dérmicas. Infecciones amebianas e infecciones fúngicas sistémicas. Parálisis infantil espinal (exceptuando los casos de participación cerebral). Edemas linfáticos tras vacunación con BCG. Glaucoma.

**Incompatibilidades e interacciones**

Fortecortín 40 mg puede administrarse con las soluciones intravenosas de uso habitual en clínica, pero no debe mezclarse con soluciones fuertemente ácidas, ni con las de: clorpromacina, vancomicina, tetraciclinas o las de edisilato de proclorperacina.

**Otras interacciones**

| Medicamento | Efecto |
|---|---|
| Glucósidos cardíacos | Aumento del efecto del glucósido por pérdida de potasio. |
| Saluréticos | Aumento de la eliminación del potasio. |
| Antidiabéticos orales | Reducción del efecto hipoglicemiante. |
| Anticoagulantes cumarínicos | Reducción del efecto anticoagulante. |

| | |
|---|---|
| Rifampicina | Acción corticoide disminuida. |
| Acido salicílico y derivados | Aumento de las posibilidades de hemorragia digestiva. |

**Advertencias**
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

**Efectos secundarios**
El peligro de los efectos secundarios es mínimo en la corticoterapia de corta duración. En general las alteraciones metabólicas (metabolismo proteico, hidrocarbonado, hiperglicemia, etc.), la disminución de la resistencia a las infecciones y la osteoporosis, no ocurren cuando el tratamiento con altas dosis no excede de tres días. Debe prestarse atención a las hemorragias por úlcera del tracto gastrointestinal (en su mayoría por stress) que pueden producirse en los primeros días de tratamiento. Se recomienda la administración de antiácidos durante la corticoterapia a altas dosis.

**Intoxicación y su tratamiento**
La administración de grandes dosis de dexametasona por vía intravenosa puede producir manifestaciones de excitación del S.N.C. En estos casos está indicada la administración de fenobarbital, que reduce la vida media de la dexametasona en un 44%. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

**Presentación**
Envase con 25 inyectables de 5 ml.
Con receta médica.
No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar las ampollas en el embalaje exterior para protegerlas de la luz.
Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

**Merck, S.L.**
María de Molina, 40
28006 Madrid